



Soplówka jodłowa

Środowisko występowania soplówki
– górski drzewostan jodłowy zagospodarowany
rębnią stopniową udoskonaloną.

Soplówka – grzyb saprotroficzny

Interesującą grupą grzybów są gatunki z rodzaju soplówek. Odznaczają się one bardzo ciekawym kształtem owocników. Wśród nich na uwagę zasługuje soplówka jodłowa – gatunek związany z lasami górskimi.

Tekst i zdjęcia

MARCIN PLAZA

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

Soplówka jodłowa to grzyb jednoroczny barwy białej, który z czasem przebarwia się na kremowo i żółtawo. Owocniki pojawiają się od sierpnia do października. Zbudowane są z wielokrotnie rozgałęziających się gałązek zakończonych charakterystycznymi igielkami. Do podłoża są przytwierdzone trzonem. Gatunek ten występuje na jodle (rzadziej na innych drzewach iglastych) w lasach iglastych i mieszanych – naturalnych i o charakterze zbliżonym do naturalnych. Soplówka spotykana jest przede wszystkim w lasach górskich i podgórskich, w miejscach wilgotnych. Wyrasta na martwych, przewróconych lub stojących pniach drzew. Szczególnie na jodłach o grubej średnicy. Obecnie jest to gatunek będący pod ochroną częściową.

Do ochrony soplówki jodłowej konieczne jest pozostawianie martwego drewna w lesie w różnych stadiach rozkładu oraz zachowanie kęp starodrzewu. Działanie takie jest realizowane w ramach proekologicznej gospodarki leśnej prowadzonej w Polsce przez Lasy Państwowe. Pozyskując drewno w warunkach górskich i podgórskich leśnicy stosują tzw. rębnię stopniową udoskonaloną. Polega ona na wykonywaniu w drzewostanie cięć jednostkowych, grupowych i smugowych. Dzięki takiemu postępowaniu zachowana zostaje trwa-

Soplówka jodłowa

należy do grzybów saprotroficznych, czyli takich, które wykorzystują do swoich funkcji życiowych martwą materię organiczną. Szacuje się, że występowanie 1/3 gatunków grzybów jest zależne od obecności w lesie martwego drewna.



łość lasu i ciągłość produkcji. Ponadto na powierzchniach zrębowych pozostawia się martwe drewno w postaci drzew dziuplastych, powalonych kłód, pni czy gałęzi. Z użytkowania są wyłączone także strome jary i potoki, gdzie kumulacja martwego drewna szczególnie sprzyja rozwojowi soplówki jodłowej. ■